



گزارش اولیه زمین لرزه با بزرگی ۴/۸ شهرستان نطنز، استان اصفهان

مورخ ۰۲ فروردین ماه ۱۴۰۴


تاریخ گزارش:

۰۲ فروردین (ویرایش ۱)



معرفی رویداد

در ساعت ۱۰ و ۲۳ دقیقه (به وقت محلی) روز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ هجری شمسی، مطابق با ساعت ۰۶ و ۵۳ دقیقه (به وقت جهانی) روز ۲۱ مارس ۲۰۲۵ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴/۸ در فاصله ۲/۰ کیلومتری نطنز در شهرستان نطنز از استان اصفهان به وقوع پیوست (شکل ۱). رومرکز این رویداد براساس لرزه‌نگاشتهای ثبت شده در مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن کشور (IIEES) در مختصات ۳۳/۵۳ درجه عرض شمالی و ۵۱/۹۳ درجه طول خاوری قرار دارد. براساس آخرین مکان‌یابی صورت گرفته، عمق کانونی زمین‌لرزه حدود ۱۰/۰ کیلومتر برآورد شده است.




شکل ۱: موقعیت کانون زمین‌لرزه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ نطنز براساس گزارش مراکز لرزه‌نگاری مختلف


جدول ۱: اطلاعات زمین لرزه به همراه سازوکار کانونی به نقل از مراکز لرزه شناسی

نام مرکز	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	عمق	بزرگا
^۱ GFZ	۵۱/۹۴	۳۳/۵۳	۱۰/۰	۴/۸
^۲ IRIS	۵۲/۰۷	۳۳/۴۹	۱۰/۰	۴/۸
^۳ AUTO	۵۱/۹۳	۳۳/۵۳	۱۰/۰	۴/۸
^۴ EMSC	۵۲/۰۷	۳۳/۴۹	۱۰/۰	۴/۸
^۵ IRSC	۵۱/۹	۳۳/۵۵	۱۰/۰	۵/۰

^۱ مراکز زلزله شناسی هلمهولتز، پستدام آلمان^۲ مرکز تحقیقاتی یکپارچه زلزله شناسی آمریکا^۳ سامانه اتوماتیک پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله^۴ مرکز لرزه‌شناسی اروپا و مدیترانه^۵ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران



شکل ۲: توزیع زمین‌لرزه‌های تاریخی (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲) در گستره زمین‌لرزه ۰۲ فروردین ماه ۱۴۰۴ نظر نظر (ستاره)



شکل ۳: نقشه لرزه‌خیزی دستگاهی گستره مهلزه‌ای زمین‌لرزه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ نطنز (ستاره) براساس کاتالوگ زمین‌لرزه‌های پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

مراجع

- [۱] تاریخ زمین لرزه ایران نوشته ن.ن.امبرسیز و چ.پ.ملویل
- [2] Hessami, K., F. Jamali and H. Tabassi, 2003. Major Active Faults of Iran (map). Ministry of Science, Research and Technology, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.
- [3] Abrahamson, N. A., Silva, W. J., & Kamai, R. (2014). Summary of the ASK14 ground motion relation for active crustal regions. *Earthquake Spectra*, 30(3), 1025-1055.
- [4] Sinaeian, Zare, Fukushima (2007), A Study on the Empirical PGA Attenuation Relationship in Iran', SEE5
- [5] Ghasemi, FuKushima, Koketsu (2009), 'An empirical Spectrum Ground-Motion'
- [6] Kanno, T., Narita, A., Morikawa, N., Fujiwara, H., & Fukushima, Y. (2006). A new attenuation relation for strong ground motion in Japan based on recorded data. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96(3), 879-897.
- [7] Kotha, S. R., Bindi, D. and Cotton, F. (2016) 'Partially non-ergodic region specific GMPE for Europe and the Middle-East', *Bull. Earthquake Eng.*14: 1245 - 1263
- [8] Zafarani, H., Luzzi, L., Lanzano, G., & Soghrat, M. R. (2018). Empirical equations for the prediction of PGA and pseudo spectral accelerations using Iranian strong-motion data. *Journal of Seismology*, 22(1), 263-285.
- [9] Worden, C. B., Wald, D. J., Allen, T. I., Lin, K., Garcia, D., and Cua, G. (2010). A revised ground-motion and intensity interpolation scheme for ShakeMap. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 100(6), 3083-3096.
- [10] Borcherdt, R.D. (1994). Estimates of site-dependent response spectra for design (methodology and justification), *Earthquake Spectra* 10, 617-654.
- [11] Allen, T. and D.J. Wald (2009). On the use of high-resolution topographic data as a proxy for seismic site conditions (VS30), *Bull. Seism. Soc. Am.* 99(2A), 935-943.